

RACCOLTE FAUNISTICHE COMPIUTE NEL GARGANO  
DA A. GHIGI E F. P. POMINI

VIII. - EMITTERI (\*)

CESARE MANCINI

SVMMARIVM. — Octoginta tres recensentur species hemipterorum heteropterorum, quae ab Exc.mo prof. A. GHIGI, Academico Pontificio, et a doct. F. POMINI in Gargano collectae sunt, et octo species a doct. POMINI collectae in Diomedeis insulis (quinque species antehac in his insulis nunquam repertae erant): maximi momenti sunt praesertim *Calocoris annulus* Brull. et *Spilostethus gibbicollis* Costa.

Gli emitteri eterotteri raccolti dal Prof. A. GHIGI e dal Dott. F. POMINI al Gargano non sono molti, in totale 83 specie; dato che nulla si conosce di questa regione e che alcune specie meritano di essere segnalate, credo utile pubblicarne l'elenco.

Riguardo alla distribuzione geografica poco si può dire, dato l'esiguo numero di specie raccolte; la fauna, come era da prevedere, è prevalentemente meridionale, infatti ben 31 sono le specie di questa zona, di esse va notato il *Calocoris annulus* Brull. che è specie pontica o lo *Spilostethus gibbicollis* Costa che è propria del Mediterraneo occidentale. È da segnalare inoltre la contemporanea presenza del *Rhinocoris Costae* Picco, specie probabilmente endemica dell'Italia centro-meridionale, e del *Rhinocoris anulatus* L. specie molto più settentrionale; è veramente interessante la presenza delle tre seguenti specie

(\*) Nota presentata dall'Accademico Pontificio S. E. Alessandro Ghigi il 29 settembre 1949.

*Psallus varians* H. S., *Catoplatus fabricii* St. o *Gastrodes grossipes* De G. note da noi solamente dell'Italia settentrionale.

*Notonecta viridis* Delcourt, *Velia Mulleri* Tom., *Rhinocoris Costae* Picco, *Calocoris hispanicus* Gimel., *Megalocoleus aurantiacus* Fieb., *Spilostethus gibbicollis* Costa e *Strobilotoma thypaicornis* F. non si trovano in Dalmazia e Albania.

Gli emitteri raccolti dal Dott. F. POMINI alle isole Tremiti sono solamente 8; ma pure essi interessano, perchè ben 5 specie non figurano tra quelle raccolte dal Dott. G. CECCONI (1).

Ringrazio il Prof. A. GHIGI di avermi concesso lo studio di questo materiale veramente interessante.

#### FAM. NOTONECTIDAE

##### *Notonecta obliqua* Gall.

Selva Umbra VIII-1934, 3 esemplari, leg. A. Ghigi. Un esemplare colle due macchie laterali omerali delle emielitre ben sviluppate e due esemplari con le macchie ridottissime, questi due esemplari si possono riferire alla varietà *meridionalis* Poiss. Europa media e meridionale; tutta Italia, la varietà è indicata del Veneto, Abruzzo o Lazio.

##### *Notonecta viridis* Delcourt.

Selva Umbra VIII-1934, 2 esempl. leg. A. Ghigi. Specie mediterranea, arriva fino all'Inghilterra; tutta Italia. I due esemplari sono pochissimo pigmentati e quindi riferibili alla forma tipica.

#### FAM. GERRIDAE

##### *Gerris thoracicus* Schumm.

Alveo S. Egidio V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie euro-sibirica, arriva al Marocco; tutta Italia, ma non comune.

(1) G. CECCONI, *Contributo alla fauna delle isole Tremiti*. «Boll. Mus. Zool. e Anat. comparata dell'Università di Torino», 1908-XXIII, N. 503.

*Gerris lacustris* L.

Bosco Sfilze V-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Specie eurosiberica; tutta Italia.

## Fam. VELIIDAE

*Velia Müllerii* Tam.

S. Menaio IV-1940, 1 esempl.; Bosco Sfilze V-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Dalmazia, Italia meridionale (Puglie, Calabria, Sicilia), potrebbe essere una specie pontica, però è da troppo poco tempo che è stata descritta (1947) e quindi bisogna attendere la segnalazione di altre catture.

*Velia major* Put.

Valle d'Umbra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie mediterranea; tutta l'Italia peninsulare, arriva alla Romagna e al versante nordico dell'Appennino Genovese.

## Fam. HYDROMETRIDAE

*Hydrometra stagnorum* L.

Alveo S. Egidio IV-1940, 1 esempl. Bosco Sfilze V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie euroasiatica, arriva all'Algeria, Marocco e Isole Canarie; tutta Italia.

## Fam. NABIDAE

*Nabis myrmercoides* Costa

Ginestra IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie di larga distribuzione geografica; tutta Europa, Regione mediterranea, Caucaso, Siberia, Regione neartica; comune in tutta Italia.

*Nabis ferus* L.

Selva Umbra V e IX-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Comune in tutta la Regione paleartica; comunissimo in tutta Italia.

*Nabis rugosus* L.

Selva Umbra V e IX-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Specie eurossiberica, si spinge all'Algeria e Marocco; tutta Italia.

## Fam. REDUVIIDAE

*Holotrichins denudatus* Costa.

Isole Tremiti: S. Domino IV-1941, 1 esempl. allo stato larvale leg. F. Pomini. Già raccolto alle Tremiti da G. Cecconi, specie dell'Italia meridionale, Grecia, Ungheria e Russia meridionale, non si trova sull'altra sponda dell'Adriatico.

*Pirates hybridus* Scop.

Alveo S. Egidio IV-1940, 5 esempl. leg. F. Pomini. Specie mediterranea estesa fino al Caucaso e Turchestan; tutta Italia.


*Rhinocoris annulatus* L.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. ♂ leg. F. Pomini. Europa, Caucaso. Siberia; indicato di tutta l'Italia, ritengo però che nell'Italia meridionale e in Sicilia sia sostituita dalla specie seguente.

*Rhinocoris Costae* Picco.

Ginestra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Descritto da L. Picco nel 1920 (« Boll. Soc. Zool. Italiana » Sez. IV, Vol. I, pag. 99) senza indicare la località; ma dal titolo del suo lavoro « Descrizione di tre nuove specie di emitteri dell'Italia centrale » è da ritenersi che la specie sia descritta del Lazio; in seguito è stata solamente indicata da E. Boselli che la trovò frequente in Sicilia nella zona di Uria-S. Piero Patì ove depone le uova sulle piante di nocciolo; io la conosco del M. Argentario, Perugia, Sasso Furbara (Lazio), M. Volture, Palizzi e Soveria Manelli (Calabria), Messina. Non comprendo perchè W. Stichel non la nomini nel suo catalogo degli emitteri europei, è una buona specie e si distingue facilmente dall'*annulatus* L. per la sua forma più snella, per il colorito dei suoi femori che hanno tre

anelli rossi e tre neri per il segmento genitale del ♂. Siccome Picco nella descrizione del segmento genitale del ♂ non è molto chiaro, ne riproduco la figura insieme a quella dell'*annulatus* L. È veramente interessante come nel Gargano vi siano le due specie.



Superiormente: *Rhynocoris Costae* Picco - Segmento genitale maschile.

Inferiormente: *Rhynocoris annulatus* L. - Segmento genitale maschile.

#### Fam. PHYMATIDAE

*Phymata crassipes* F.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa media, Regione mediterranea, Caucaso, Siberia, Asia Minore; tutta Italia.

## Fam. MIRIDAE

*Adelphocoris vandalicus* Rossi.

Varano 15-VIII-1934, 3 esempl. leg. A. Ghigi, Selva Umbra IX-1940 2 esempl. leg. F. Pomini. Specie meridionale arriva alla Germania meridionale; tutta Italia.

*Adelphocoris lineolatus* Goeze.

Selva Umbra IX-1940, 2 esempl., Ginestra, 1 esempl. leg. F. Pomini, tutti gli esemplari appartengono alla var. *binotatus* Hhn. Specie comunissima in tutta la Zona paleartica e in Italia.

*Calocoris Schmidtii* Fieb.

Selva Umbra V-1940, 9 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale, Germania, Danimarca, Russia meridionale, Asia Minore, Caucaso, Regione neartica. Indicato dell'Italia meridionale e di Torino, io lo conosco pure del Veneto (Montello, Tarvisio).

*Calocoris annulus* Brullé.

Ginestra V-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Italia, Jugoslavia, Grecia, Asia Minore, Siria. D'Italia è indicato della Liguria, Venezia Giulia, Romagna, Toscana e Sardegna, io lo conosco pure del versante settentrionale dell'Appennino Genovese (Serravalle Scrivia), dell'Umbria e della Basilicata; specie certamente Pontica, penetrata in Italia più probabilmente dal ponte Garganico che dalla Venezia Giulia.

*Calocoris hispanicus* Gmel.

Alveo S. Egidio V-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini, 2 esempl. si riferiscono alla var. *nigradorsum* Costa.

Specie mediterranea arriva al Wurtemberg; comune nell'Italia meridionale e centrale.

*Calocoris norvegicus* Gmel.

Mandrione V-1940, 23 esempl. Alveo S. Egidio V-1940, 8 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Africa del nord, Siria, Asia Minore, Regione Neartica; comune in tutta Italia.

*Pycnopterna striata* L.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Caucaso, Siria; è probabile che si trovi in tutta Italia; ma molto rara.

*Stenotus binotatus* F.

S. Nicandro V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Asia Minore, Siberia, Regione Etiopica e Neartica; tutta Italia.

*Lygus pratensis* L.

S. Egidio 12-VIII-1934, 7 esempl. Alveo S. Egidio VIII-1934, 5 esempl. leg. A. Ghigi, Selva Umbra IX-1940, 23 esempl. Ginestra IX-1940, 6 esempl. leg. F. Pomini. Comune in tutta la Regione Palearctica; comunissima in tutta Italia.

*Poeciloscytus cognatus* Fieb.

S. Egidio 12-VIII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi. Europa, Asia Minore, Caucaso, Turkestan, Siberia; tutta Italia.

*Capsodes mat* Rossi.

Ginestra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale, Tunisia; sparsa in tutta l'Italia centrale e meridionale, Venezia Giulia.

*Capsodes cingulatus* F.

Ginestra V-1940, 4 esempl. leg. F. Pomini. Europa media e meridionale, Algeria, Asia Minore; indicato della Sicilia, io lo conosco pure della Toscana, Lazio e Calabria.

*Stenodema calcaratum* Fall.

Selva Umbra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Tutta Europa, Marocco, Algeria, Tunisia, Siria, Asia Minore, Caucaso, Turkestan, Siberia, Abissinia; tutta Italia.

*Stenodema laevigatum* L.

Varano 15-VIII-1934, 2 esempl. leg. A. Ghigi, Ginestra V-1940, 1 esempl., Selva Umbra IX-1940, 11 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Algeria, Asia minore, Caucaso, Turkestan cinese, Regione Neartica; tutta Italia, comune.

*Notostira tricolorata* Costa.

Selva Umbra, IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Eurosi-birica; sparsa in tutta Italia.

*Megalocera linearis* Fuessl.

S. Nicandro V-1940, 8 esempl., Mandrione V-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Algeria, Caucaso; tutta Italia, comune.

*Cyllocoris flavoquadrimaculatus* De G.

Ginestra V-1940, 1 esempl. leg. F. Domini. Europa, Caucaso; Italia settentrionale e centrale, Sicilia.

*Megalocoleus aurantiacus* Fieb.

Mandrione V-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale, Algeria, Asia Minore, Sicilia, Sardegna, Corsica, Is. Capraia, Is. Giglio; io l'ho raccolto nel Lazio (Rocca di Papa), probabilmente si trova in tutta l'Italia meridionale.

*Psallus variabilis* Fall.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Eurosibi-rica, arriva all'Algeria; tutta Italia.

*Psallus varians* H. S.

Selva Umbra V-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Europa; indicato solamente dell'Italia settentrionale.



## Fam. TINGIDAE

*Catoplatus Fabricii* St.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Baltico, Norvegia, Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Ungheria, Austria, Italia, Romania; specie settentrionale, in Italia è indicata solamente per la parte continentale, questa sarebbe la cattura più meridionale conosciuta.

*Monanthia echiæ* Schrk.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Regione Mediterranea; tutta Italia.

## Fam. PYRRHOCORIDAE

*Pyrrhocoris apterus* L.

Alveo S. Egidio IX-1940, 1 esempl., Isole Tremiti-S. Nicola, IV-1940, 12 esempl. leg. F. Pomini. Regione Palearctica, Nearctica e Orientale, tutta Italia, comunissimo.

## Fam. MYODICHIDAE

*Spilostethus pandurus* Scop.

S. Egidio VIII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi, Cagnano Varano IV-1941, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, Turkestan, Regione Etiopica, Orientale e Australiana; tutta Italia, comune nella parte peninsulare, rara nella parte continentale.

*Spilostethus equestris* H. S.

Varano 15-VIII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi, Mandrione V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Palearctica; tutta Italia.

*Spilostethus gibbicollis* Costa.

Cagnano Varano IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia. Specie del Mediterraneo occidentale, indicata per l'Italia, della Sicilia, Calabria e Sardegna, io la conosco pure della Basilicata.

*Lygaeosoma reticulatum* St.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Eurosiberica, arriva al Nord Africa; tutta Italia, molto comune.

*Piocoris erythrocephalus* Le P. S.

S. Menaio V-1940, 1 esempl., Ginestra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, Crinea, Caucaso; Italia centrale e meridionale, non comune.

*Macroplax fasciata* H. S.

Ginestra V-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, Caucaso, Turchestan; comune in tutta Italia.

*Raglius saturnius* Rossi.

Isole Tremiti-S. Domino IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, Russia meridionale; Italia centrale e meridionale, raro nell'Italia settentrionale, nuovo per le Tremiti.

*Raglius vulgaris* Schill.

Ginestra V-1940, 1 esempl., Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Asia Minore, Caucaso, Transcaspio; tutta Italia.

*Ischnopeza hirticornis* H. S.

Mandrione V-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale Algeria, Siria, Caucaso, Transcaspio; per l'Italia è indicata solamente dell'Abruzzo e della Sicilia, io la conosco pure di Basilicata e di Calabria.

*Gastrodes grossipes* De. G.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Eurosiberica; Italia settentrionale, Corsica, nuovo per l'Italia meridionale.

## Fam. NEIDIDAE

*Apodymus pectoralis* Fieb.

S. Menaio IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale, Asia Minore; Italia meridionale, Lazio, Sardegna, Corsica.

*Gampsocoris puncticeps* Germ.

Selva Umbra VI-1941, 1 esempl. leg. F. Pomini. Media e sud Europa, Marocco, Algeria, Turkestan; tutta Italia.

## Fam. COREIDAE

*Gonocerus acuteangulatus* Goeze.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa media e meridionale, Asia Minore, Caucaso, Turkestan; tutta Italia.

*Syromastes rhombea* L.

Selva Umbra V-1940, 2 esempl., IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Tutti gli esemplari si riferiscono alla var. *quadrata* F. Specie mediterranea arriva al Caucaso, Turkestan e Transcaspio; tutta Italia, rara nella valle del Po.

*Mesocerus marginatus* L.

Varano 15-VIII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi, Selva Umbra IV-1940, 1 esempl., V-1940, 6 esempl., IX-1940, 4 esempl. leg. F. Pomini. Tutta la Regione Palearctica ad eccezione del Nord Africa; tutta Italia, comune.

*Centrocoris spiniger* F.

S. Nicandro V-1940, 1 esempl., Mandrione V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Mediterranea, arriva alla Crimea, Caucaso, Turkestan; tutta Italia.

*Ceraleptus gracilicornis* H. S.

Ginestra V-1940, 3 esempl., Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Mediterranea, arriva alla Germania meridionale, Russia meridionale, Caucaso; tutta Italia, molto rara.

*Coriomeris Spinolae* Costa

Selva Umbra V-1940, 1 esempl., Ginestra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale, Marocco, Asia Minore, Caucaso; Italia centrale e meridionale non comune, Piemonte, Lombardia, Romagna molto rara.

*Coriomeris denticulatus* Scop.

Selva Umbra V-1940, 2 esempl., Ginestra V-1940, 3 esempl., S. Nicandro V-1940, 1 esempl., Spilze V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Euriosibirica, arriva all'Algeria; tutta Italia.

*Strobilotoma typhaecornis* F.

Ginestra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, Russia meridionale; Italia centrale e meridionale, Liguria, non comune.

*Dicranocephalus agilis* Scop.

Alveo S. Egidio IV-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Europa media, Regione Mediterranea, Canarie, Caucaso, Siberia; tutta Italia.

*Micrelytra fossularum* Rossi

S. Nicandro V-1940, 1 esempl., Selva Umbra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea; Italia peninsulare, comune, A. Griffini la indica del Piemonte senza precisare la località, dubito che si trovi in questa regione, Liguria, Istria.

*Camptopus lateralis* Germ.

S. Menaio IV-1940, 3 esempl., Selva Umbra IX-1940, 2 esempl., Ginestra IX-1940, 1 esempl., la var. *brevipes* H. S. a Cagnano Varano

IV-1940, 1 esempl. e S. Menaio IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, arriva alla Germania meridionale, Caucaso, Turchestan; tutta Italia.

*Corizus hyosciami* L.

Varano 15-VIII-1934, 1 esempl. A. Ghigi, S. Menaio IV-1940, 1 esempl., Ginestra IV-1940, 1 esempl., Mattinata IV-1940, 1 esempl., Selva Umbra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Paleartica; tutta Italia.

*Rhopalus subrufus* Gmel.

Ginestra VI-1940, 3 esempl., Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Nord Africa, Asia Minore, Caucaso, Siberia, Regione Orientale, Etiopica e Neotropica; tutta Italia.

*Rhopalus parumpunctatus* Schill.

Selva Umbra V-1940, 6 esempl., Ginestra IX-1940, 5 esempl., Mattinata IV-1941, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Canarie, Nord Africa, Turchestan, Siberia; tutta Italia, comune.

*Stictopleurus abutilon* Rossi

S. Egidio 12-VII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi, Selva Umbra IV-1940, 1 esempl., Mandrione V-1940, 1 esempl., Ginestra IX-1940, 9 esempl. leg. F. Pomini. Tutta Europa e Mediterraneo, Canarie, Caucaso, Turchestan, Siberia; tutta Italia, comune.

*Maccevetus lineola* F.

S. Domino IV-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, Caucaso, Turchestan; Italia centrale e meridionale, Liguria, Piemonte, Venezia Giulia.

*Chorosoma Schillingi* Scill.

Ginestra IX-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Algeria, Siria, Caucaso, Turchestan; Italia centrale e meridionale, indicata pure del Piemonte e Romagna, io la conosco della Laguna Veneta e dei dintorni di Trieste.

## Fam. PENTATOMIDAE

*Odontotarsus purpureo-lineatus* Rossi

Ginestra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Eurosibirica, Stichel per errore lo indica del Marocco e Algeria dove è sostituito dall'*O. grammicus* L.; tutta Italia.

*Eurygaster maurus* L.

Selva Umbra V-1940, 1 esempl., IX-1940, 1 esempl., Vacotenente IX-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea arriva all'Europa media; tutta Italia.

*Graphosoma italicum* Muell.

Varano 13-VIII-1934, 4 esempl. leg. A. Ghigi, Selva Umbra V-1940, 22 esempl., Ginestra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie Eurosibirica: tutta Italia.

*Dyrodereis umbraculatus* F.

Selva Umbra V-1940, 4 esempl., Ginestra V-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Regione Mediterranea, Russia meridionale, Caucaso; tutta Italia.

*Aelia acuminata* L.

Selva Umbra 13-VIII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi, Mattinata IV-1940, 1 esempl. S. Menaio IV-1940, 1 esempl.; Mandrione V-1940, 1 esempl., Selva Umbra V-1940, 5 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Nord Africa, Siria, Caucaso, Turchestan, Siberia; tutta Italia.

*Aelia Germari* Kust.

Isole Tremiti, S. Domino IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Spagna, Italia, Dalmazia, Marocco, Algeria; indicata per l'Italia, del Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna, Sicilia, io la conosco pure dell'Abruzzo e della Basilicata. Nuova per le Tremiti, Horwath indica questa specie della Dalmazia, però A. Kormilev, nei suoi varii elenchi degli emitteri della Jugoslavia non la cita. Specie del Mediterraneo occidentale.

*Neottiglossa pusilla* Gmel.

Selva Umbra V-1940, 3 esempl. leg. F. Pomini. Specie Eurosi-birica; tutta Italia.

*Eusarcoris melanocephalus* F.

Selva Umbra V-1940, 5 esempl., Ginestra IX-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Europa, Marocco, Algeria, Caucaso, Siberia, Giappone; tutta Italia.

*Staria lunata* Hhn.

S. Nicandro V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa media e meridionale, Algeria, Asia Minore, Caucaso, Persia; tutta Italia.

*Peribalus strictus* F.

S. Menaio IV-1940, 1 esempl., Ginestra IX-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale, Marocco, Algeria, Cirenaica, Siria; in tutta l'Italia peninsulare, Liguria, Trentino, Venezia Giulia, io lo conosco pure del Piemonte.

*Peribalus albipes* F.

Varano 15-VIII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi, Mattinata IV-1940, 1 esempl., Isole Tremiti, S. Nicola IV-1940 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa meridionale, Siria; tutta Italia; ma rara nella parte settentrionale.

*Corpocoris pudicus* Poda.

Varano 15-VIII-1934, 1 esempl., Selva Umbra 13-VIII-1934 2 esempl. leg. A. Ghigi, S. Menaio IV-1940, 5 esempl., Caprano Varano IV-1940, 1 esempl., Mandrione V-1940, 1 esempl., S. Nicandro V-1940, 1 esempl., Ginestra IX-1940, 1 esempl., Isole Tremiti-S. Domino IV-1940, 2 esempl., S. Nicola IV-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Tutti gli esemplari appartengono alle var. *fuscispinus* Boh. Regione Palearctica; tutta Italia, comunissimo, nuovo per le Tremiti.

*Dolicoris baccarum* L.

Selva Umbra 13-VIII-1936, 1 esempl. leg. A. Ghigi, IX-1940, 1 esempl., Isole Tremiti-S. Nicola IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Palearctica, Orientale e Neartica; tutta Italia, nuovo per le Tremiti.

*Eretydema ornatum* L.

Var. *pictum* H. S. Selva Umbra 13-VIII-1934, 1 esempl. leg. A. Ghigi; var. *decoratum* H. S. S. Menaio IV-1940, 5 esempl., Cagnano a Varano IV-1940, 20 esempl., Alveo S. Egidio V-1940, 1 esempl., Isole Tremiti-Caprara IV-1940, 2 esempl. leg. F. Pomini. Europa media, Mediterraneo, Caucaso, Turchestan, tutta Italia, comune, nuova per le Tremiti.

*Eretydema oleraceum* L.

Ginestra IX-1940, 1 esempl.; var. *albomarginatum* Goeze Ginestra IX-1940, 1 esempl., Selva Umbra V-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Specie cosmopolita; tutta Italia, comune.

*Rhaphigaster nebulosa* Poda.

S. Menaio IV-1940, 1 esempl., Selva Umbra IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa media e meridionale, Algeria, Asia Minore, Caucaso, Cina; tutta Italia, comune.

*Zicrona coerulea* L.

Alveo S. Egidio IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Regione Palearctica, Orientale e Neartica; tutta Italia.

## Fam. CYDNIDAE

*Brachypelta aterrima* Forst.

S. Menaio IV-1940, 1 esempl. leg. F. Pomini. Europa media, Regione Mediterranea, Caucaso, Turchestan, Siberia meridionale, Sud Africa, India, Queensland; tutta Italia.